

Guide de référence rapide

X-Zelit® améliore considérablement les taux de calcium sanguin et minimise l'hypocalcémie clinique et subclinique sans les tracas d'un programme de différence cation-anion alimentaire (DCAD).

MEILLEURES PRATIQUES POUR DONNER X-ZELIT® AUX ANIMAUX

- Gardez le phosphore alimentaire sous contrôle
 - Plage idéale : 0,30-0,35 %
 - Évitez les rapports calcium / phosphore alimentaires inversés
- Nourrissez-les de X-Zelit® pendant 14 à 21 jours
- Mélangez X-Zelit® séparément dans la ration totale mélangée (RTM)
- Gardez la RTM en dessous de 45 % de matière sèche
- Suivez la séquence de chargement appropriée
 - Ajoutez X-Zelit® aux fourrages à humidité élevée
- Traitez correctement la paille et le foin d'herbe

INCORPORER X-ZELIT® DANS LA RATION

Suivez ces directives de rationnement pour incorporer X-Zelit® dans votre programme pré-frais :

Directives de rationnement

Ingrédient	IMS	
	(lb)	(kg)
Ensilage de maïs	12-15	5,4-6,8
*Ensilage de foin	3-6	1,4-2,7
*Paille / foin d'herbe	3-6	1,4-2,7
Farine de soja / farine de canola	2-5	0,9-2,3
Source de protéines / acides aminés non dégradés dans le	0,25-1,0	0,1-0,5
Minéraux / vitamines / additifs	0,5-1,0	0,2-0,5
X-Zelit®	1,0	0,5
Apport total de matière sèche	26-30	11,8-13,6
*L'ensilage de petites graines peut remplacer une portion de l'ensilage de foin et/ou de la paille / foin	3-6	1,4-2,7

Directives nutritionnelles

< 45 % de matière sèche	0,50-0,70 % calcium
> 1 200 grammes de protéines métabolisables	0,30-0,35 % phosphore
16-20 % amidon	≥ 0,40 % magnésium
36-42 % aNDFom	0,22-0,28 % soufre
Potassium / DCAD : importance minimale	
Peut donner l'ensilage / fourrages à petits grains	
Recommandations standard pour tous les autres minéraux / vitamines	

X-ZELIT® OFFRE LE TRIFECTA DE LA GESTION :

- Pas de test de pH urinaire
- Pas besoin de fourrages à faible teneur en potassium, qui sont coûteux et nécessitent un traitement
- Utilisez uniquement des bolus de calcium pour les vaches à haut risque

Ces avantages en matière de main-d'œuvre et de gestion s'ajoutent à un gain de temps et d'argent

LES ESSENTIELS DE GESTION

Pour une transition réussie

- ✓ Fournir 30 pouces, ou 76 centimètres, d'espace à la mangeoire par vache
- ✓ Maximiser le confort de la vache
- ✓ Maintenir <100 % de densité de stockage
- ✓ Minimiser les mouvements des vaches
- ✓ Les nourrir d'un RTM riche en fibres, correctement traité et savoureux
- ✓ Se conformer aux protocoles de fraîcheur pour les vaches

Visitez xzelit.com pour en savoir plus.

xzelit®

Uncomplicated Excellence



Considérations importantes lors du passage au programme

- Tout type de changement d'alimentation supplémentaire doit être introduit lentement
- Minimiser les changements de fourrage pendant la période de transition
- Surveiller de près les vaches fraîches pendant la période de transition et fournir une thérapie de soutien en temps opportun

OPTIONS RECOMMANDÉES À EXAMINER PENDANT LA PÉRIODE DE CHANGEMENT DE 10 JOURS:

1. Divisez le pré-frais en 2 groupes:

- < 10 jours à compter de la date prévue de vêlage : Suivez le programme DCAD jusqu'au vêlage
- > 10 jours à compter de la date prévue de vêlage : Passer au programme X-Zelit

2. Retirez tous les anions de l'alimentation et donnez une alimentation de base non supplémentée pendant au moins 5 jours:

- Laissez les anions / l'acidification quitter le système de la vache
- Programme X-Zelit au plein taux au plus tard le 10ème jour de la période de transition

TRAVAILLEZ EN ÉTROITE COLLABORATION AVEC VOTRE NUTRITIONNISTE POUR DÉTERMINER LA MEILLEURE OPTION POUR VOTRE FERME LAITIÈRE !